

広島大学大学院先進理工系科学研究科入学試験問題

数 学 プ ロ グ ラ ム	専 門 科 目
---------------	---------

受験番号	M
------	---

令和 3年 1月 29日 9 : 0 0 ~ 1 2 : 0 0

注 意 事 項

1. 以下の用紙が配布されている.

問題用紙 (表紙を含む)	4 枚
解答用紙	3 枚
下書き用紙	3 枚

2. 問題は全部で 3 問ある.

3. 問題ごとに必ず一枚ずつ別々の解答用紙を用い, それぞれの解答用紙に問題番号を記入して解答せよ. 紙面が不足した場合は裏面を使用してよい.

4. 試験問題の表紙, 解答用紙, および下書き用紙のすべてに受験番号を記入せよ.

5. 試験終了時には, すべての解答用紙および下書き用紙を提出すること.

広島大学大学院先進理工系科学研究科入学試験問題

数 学 プ ロ グ ラ ム

専門科目

令和 3 年 1 月実施

次の [1], [2], [3] の全問に解答せよ.

[1] 次の (A), (B) のすべての問に答えよ.

(A) 行列

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

を考える. 以下の問に答えよ.

(1) A の固有多項式を求めよ.

(2) A の固有値と, 各固有値に対する固有ベクトルを求めよ.

(3) $J := P^{-1}AP$ がジョルダン標準形となる正則行列 P と, そのジョルダン標準形 J を求めよ.

(B) 以下において, i は虚数単位 ($i^2 = -1$) を表す. また n は正整数である. 複素数 $z = a + ib \in \mathbb{C}$ (ただし $a, b \in \mathbb{R}$) に対し, その複素共役 $a - ib$ を $\bar{z}$ と書く. 複素数を成分とするベクトル $v = p + iq \in \mathbb{C}^n$ (ただし $p, q \in \mathbb{R}^n$) に対し, 各成分の複素共役をとって得られるベクトル $p - iq \in \mathbb{C}^n$ を $\bar{v}$ と書く. 以下の問に答えよ. ただし, 複素共役が $\mathbb{C}$ における四則演算を保存すること, つまり $z, w \in \mathbb{C}$ に対し

$$\overline{z+w} = \bar{z} + \bar{w}, \quad \overline{z-w} = \bar{z} - \bar{w}, \quad \overline{zw} = \bar{z}\bar{w}, \quad \overline{z/w} = \bar{z}/\bar{w} \quad (\text{ただし } w \neq 0)$$

が成立することは証明なしに用いてもよい.

(1) A を $n \times n$ 実行列とする. $\lambda \in \mathbb{C}$ が A の固有値であり, $v \in \mathbb{C}^n$ をその固有ベクトルとする. このとき, $\bar{\lambda}$ も A の固有値であり, $\bar{v}$ がその固有ベクトルであることを示せ.

(2) A を 2×2 実行列とする. $\lambda = a + ib$ (ただし $a, b \in \mathbb{R}$) は A の固有値であり, $v = p + iq \in \mathbb{C}^2$ (ただし $p, q \in \mathbb{R}^2$) はその固有ベクトルであるとする. $b \neq 0$ ならば p, q は実線形空間 $\mathbb{R}^2$ において線形独立であることを示せ.

(3) $A, \lambda = a + ib, v = p + iq$ は (2) と同じであるとする. 実線形変換 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ を $x \mapsto Ax$ で定める. $b \neq 0$ ならば, $\mathbb{R}^2$ の適当な基底をとって線形変換 f は行列

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

により表現されることを示せ.

広島大学大学院先進理工系科学研究科入学試験問題

数 学 プ ロ グ ラ ム

専門科目

令和 3 年 1 月実施

[2] 次の (A), (B) のすべての問に答えよ。

(A) (1) 定積分

$$\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \frac{dx}{\sin x}$$

の値を求めよ。

(2) $a > 0, b > 0$ とする。定積分

$$\int_0^{\pi/2} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}$$

の値を求めよ。

(B) $x \in \mathbb{R}$ に対し $\Lambda(x) = \min_{n \in \mathbb{Z}} |x - n|$ とし、

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Lambda(2^k x)}{3^k}$$

とする。以下の問に答えよ。

(1) 任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対し、

$$|\Lambda(x) - \Lambda(y)| \leq |x - y|$$

が成立することを示せ。

(2) 任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対し、

$$|f(x) - f(y)| \leq 3|x - y|$$

が成立することを示せ。

(3) α は無理数で $0 < \alpha < 1$ とし、その 2 進数表示を $0.a_1a_2a_3 \cdots$ とする。すなわち、

$$\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{2^n}, \quad a_n \in \{0, 1\}$$

が成立しているとする。このとき、 $f(x)$ は $x = \alpha$ で微分可能であり、微分係数 $f'(\alpha)$ は

$$\beta = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{a_{k+1}} \left(\frac{2}{3}\right)^k$$

と等しいことを示せ。

広島大学大学院先進理工系科学研究科入学試験問題

数 学 プ ロ グ ラ ム

専門科目

令和 3 年 1 月実施

[3] X を位相空間とする。 X 上に二項関係 $\sim$ を

$$x \sim y \iff \begin{array}{l} X = U \cup V \text{ かつ } U \cap V = \emptyset \text{ かつ } x \in U \text{ かつ } y \in V \text{ をみた} \\ \text{す } X \text{ の開集合 } U, V \text{ は存在しない,} \end{array}$$

で定義する。以下の問に答えよ。

(1) $\sim$ は同値関係であることを示せ。

(2) C は X の連結部分空間であるとする。このとき、任意の $x, y \in C$ に対し、 $x \sim y$ が成立することを示せ。

(3) 平面 $\mathbb{R}^2$ を通常のユークリッド距離により位相空間とみなす。2 以上の整数 n に対し、 R_n を平面 $\mathbb{R}^2$ 上の原点を中心とする半径 $1 - 1/n$ の円周とする。平面 $\mathbb{R}^2$ の部分空間 W を

$$W := \{(1, 0), (0, 1)\} \cup \bigcup_{n=2}^{\infty} R_n$$

により定義する。 W において $(1, 0) \sim (0, 1)$ が成り立つことを示せ。

以下、点 $x \in X$ を含む $\sim$ についての同値類を $[x]$ と書く。また、 X の部分集合で閉かつ開であるものを閉開集合と呼ぶ。

(4) $[x]$ は x を含むすべての閉開集合の共通部分であることを示せ。

(5) W を (3) で定義された $\mathbb{R}^2$ の部分空間とする。 W における $\sim$ についての同値類 $[(1, 0)]$ は連結か？ 理由とともに述べよ。