

【本件リリース先】

文部科学記者会、科学記者会、
広島大学関係報道機関
京都大学記者クラブ



広島大学



京都大学

KYOTO UNIVERSITY

広島大学広報室

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2

TEL : 082-424-4383 FAX : 082-424-6040

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp

NEWS RELEASE

令和 7 年 6 月 10 日



臓器移植後の拒絶反応を引き起こす抗体の発生は、
移植前に高精度な予測が可能！

～より安全な移植治療に向けて～

論文掲載

【本研究成果のポイント】

- ・臓器移植を受ける患者さんで拒絶反応の原因となる“抗体”ができるリスクを、移植前に高精度で予測できるようになりました。

【概要】

広島大学原爆放射線医科学研究所の進藤岳郎 准教授、京都大学大学院医学研究科の平田真章 博士課程学生（現 UCLA 博士研究員）、月田和人 特任助教、波多野悦朗 教授らの研究グループは、京都大学医学部附属病院で実施された肝臓・肺・腎臓移植、および秋田大学附属病院で実施された腎臓移植のデータベースに基づき機械学習による解析を行い、ドナー（臓器提供者）からレシピエント（患者）に臓器移植を行う際に拒絶反応の原因となる抗体（ドナー特異的抗体：DSA）が発生するリスクを予測できることを明らかにしました。

また、この解析結果に基づき「エプレットリスクスコア（ERS）」という新しい指標を開発しました。これは DSA の発生を正確に予測できるツールとして、より安全なドナー選択や患者ごとの薬の選択に役立つことが期待されます。

本成果は、2025 年 5 月 31 日午前 4 時（日本時間）に Cell Press が発行する米国の国際学術誌「Cell Reports Medicine」にオンライン掲載されました。

Hirata M, Tsukita K, Shindo T*, Yagi S, Ito T, Tanaka S, Fujimoto R, Kayawake H, Nakamura K, Fujiyama N, Saito M, Yurugi K, Hishida R, Kato A, Kawaguchi A, Habuchi T, Kobayashi T, Date H, Hatano E. Cross-Organ Hierarchy of HLA Molecular Mismatches in Donor-Specific Antibody Development in Solid Organ Transplantations

Cell Rep Med 2025, doi: [10.1016/j.xcrm.2025.102153](https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2025.102153)

*：責任著者

【背景】

臓器移植は重症臓器不全に対する根治的治療です。しかし移植された臓器がレシピエント（患者）のもつ免疫によって拒絶されてしまうことがあり、せっかく移植した臓器が傷害されることや機能停止に至ることがあります。この拒絶反応が発生する原

因の 1 つは、レシピエントの体内で「ドナー特異的抗体（donor-specific antibody: DSA）」というたんぱく質ができてしまうことです。

私たちの細胞はヒト白血球抗原（human leukocyte antigen: HLA）というたんぱく質をもっています。HLA は自己と非自己の識別に関わり、両親それぞれから受け継がれ、人によって異なります。臓器移植を行い、レシピエントの体内にドナーの HLA が入ることで、レシピエントの免疫細胞が「この移植された臓器は異物だ」と判断してしまい、DSA を発生させて臓器を攻撃してしまいます。よって、ドナーとレシピエントの HLA の「相性」が DSA 発生リスクと関連しますが、HLA のパターンは数十万通り以上に及び、ドナーとレシピエントの HLA の組み合わせの数は天文学的です。そのため DSA の発生を移植前に予測することはこれまで不可能で、DSA を伴う拒絶の抑制・治療法も未確立でした。

これまで HLA の「相性」は抗原や遺伝子型の一致という捉え方で評価されてきましたが、それだけでは DSA の発生を正確に予測することはできませんでした。そこで最近では、HLA 分子の表面にある「エプレット」と呼ばれる、抗体が反応するごく小さな構造が注目されています。エプレットレベルで“HLA の相性”を評価することで、より高精度な拒絶リスク評価が可能になると期待されています。しかし「どのエプレットが高リスクか」を定量的に示す方法や、それが肝臓、肺、腎臓といった臓器の種類を超えて共通しているかどうかについては、明らかになっていませんでした。また個々のエプレットミスマッチが免疫反応をどれほど引き起こすかについても、実験的に検証された例はほとんどありませんでした。

【研究成果の内容】

本研究では、京都大学医学部附属病院および秋田大学附属病院の肝臓・肺・腎臓移植患者 978 組のデータを用いて、ドナーとレシピエントの間にある個々の HLA「エプレット」ミスマッチが、移植後に DSA が産生されるリスクとどう関係しているかを解析しました。

その結果、すべてのエプレットが同じようにリスクを持つわけではなく、あるエプレットは特に強く DSA と関連している一方で、別のエプレットはほとんどリスクがないことがわかりました。さらにこの「エプレットごとのリスクの序列」は、肝臓・肺・腎臓といった移植される臓器の種類にかかわらず一貫して共通していることも明らかになりました。

これらの知見をもとに、機械学習を用いて各エプレットのリスクに重みづけを行い、エプレットリスクスコア（ERS）を構築しました。従来のエプレットミスマッチの単純な個数に基づく予測と比較して、ERS は DSA の発生を約 2 倍の精度で予測しました。さらにこの予測精度は臓器の種類を問わず一貫しており、ERS の高い汎用性も明らかになりました。

さらに、ERS の免疫学的な妥当性を検証するために、健常人の血液細胞を用いた混合リンパ球反応（mixed lymphocyte reaction: MLR）の実験を行いました。その結果、ERS が高い HLA の組み合わせでは、CD4 陽性 T 細胞がより強く反応して増殖することが確認され、DSA 発生リスクの高いエプレットに対する抗体を加えるとその反応が抑制されることも明らかになりました。これにより、ERS は免疫反応の強さを反映する科学的な指標であること、さらに HLA エプレットが移植後拒絶の治療標的となる可能性まで示されました。


【今後の展開】

ERS は移植前に個別の患者における DSA 産生リスクを予測することを可能にし、より安全なドナー選択や、患者ごとの免疫抑制薬の調整に役立つと期待されます。今後は、日本全国の移植施設や海外施設を含めて ERS の有用性をさらに検証し、国際的な評価指標として確立を目指します。さらに、リスクの高いエプレットに基づいた新たな免疫抑制戦略や治療法の開発にもつながる可能性があります。


【研究プロジェクトについて】

本研究は、**日本医療研究開発機構（AMED）**の支援を受けて実施されました（研究費番号：23ek0510035h9903、研究代表：進藤岳郎）。
また、本研究成果は広島大学から論文掲載料の助成を受けています。

【参考資料】



ドナーと患者のHLA “eplet”の相性がDSA産生に深く関わっていることを発見



【用語解説】

注 1) HLA と HLA 適合度：

HLA（ヒト白血球抗原）は、免疫に関わるたんぱく質で、臓器移植の際にはドナーとレシピエントのHLAがどれだけ似ているか（適合度）が重要です。適合していないと、レシピエントの免疫がドナーの臓器を“異物”とみなして攻撃する恐れがあります。

注 2) ドナー特異的抗体（DSA）：

ドナーのHLAに対してレシピエントが産生する抗体で、これがあると移植された臓器が拒絶されるリスクが高まります。

注 3) HLA エプレット：

HLA分子表面にある、抗体が特に認識しやすいごく小さな構造単位。エプレットの違いが、抗体ができるかどうかに関係します。

注 4) 混合リンパ球反応（MLR）：

HLAの異なる健常人2名の白血球を試験管内で混ぜ、免疫細胞がどの程度反応するかを測定する実験方法。HLAの相性が悪いほど、強い反応が起こります。

【お問い合わせ先】

【研究に関すること】

原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科研究分野
進藤岳郎

Tel : 082-257-5861 FAX : 082-256-7108

E-mail : takero@hiroshima-u.ac.jp

【広報に関すること】

広島大学広報室

TEL : 082-424-4383

E-mail : koho@office.hiroshima-u.ac.jp

京都大学広報室国際広報班

TEL : 075-753-5729 FAX : 075-753-2094

E-mail : comms@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp

発信枚数：A 4 版 4 枚（本票含む）