

配布先：宮城県政記者会、文部科学記者会（東北大学）、京都大学記者クラブ（京都大学）、広島大学関係報道機関（広島大学）、経済産業記者会、経済産業省ペンクラブ、中小企業庁ペンクラブ、資源記者クラブ、科学記者会、筑波研究学園都市記者会（産総研）、兵庫県政記者クラブ、西播磨県民局記者クラブ、中播磨県民局記者クラブ（理研）

解禁日：平成 28 年 12 月 5 日（日本時間 19：00）



TOHOKU  
UNIVERSITY



KYOTO UNIVERSITY  
FOUNDED 1897



HIROSHIMA UNIVERSITY



RIKEN  
Since 1917



平成 28 年 12 月 5 日

報道機関 各位

東北大学多元物質科学研究所  
京都大学大学院理学研究科  
広島大学大学院理学研究科  
産業技術総合研究所  
理化学研究所  
高輝度光科学研究センター

## 原子の集団が数珠つなぎに電子を放出する！ —極紫外自由電子レーザーで誘起される新現象解明—

### 【概要】

東北大学多元物質科学研究所上田潔教授・福澤宏宣助教のグループ、京都大学大学院理学研究科八尾誠教授・永谷清信助教のグループ、広島大学大学院理学研究科和田真一助教、ドイツ国ハイデルベルグ大学ローレンツ・セダーバウム教授のグループ、産業技術総合研究所分析計測標準研究部門齋藤則生副研究部門長、理化学研究所放射光科学総合研究センター矢橋牧名グループディレクター等による合同研究チームは、日本初の短波長自由電子レーザー\*1装置である、SCSS 試験加速器\*2 から供給される強力な極紫外光パルスでネオン原子の集団に照射すると、多くの電子が数珠つなぎで飛び出してくる新しい現象を発見しました。

強力な極紫外光パルスで物質に照射すると、これまでになく特異な状態を生成することが可能です。特に、物質のイオン化エネルギーよりもわずかに低い光子エネルギー（1つの光子当たりのエネルギー）を持つ極紫外光パルスを用いると、物質内の多くの電子を同時に励起することができます。このような多重励起状態は電子を放出しながら安定な状態へと緩和すると予想されますが、詳細は知られていません。本研究では、強力な極紫外光パルスで希ガスのネオン原子が多数集まったクラスター\*3 と呼ばれる原子集団に照射し、放出される電子の運動エネルギーを計測しました。得られたスペクトルを理論計算と比較して、多重励起状態にあるネオン原子クラスターから様々なエネルギーを持った電子が、これまでに知られていなかった新たな経路を経て次々に放出されることを解明しました。

本研究の成果は、平成 28 年 12 月 5 日、英国の科学電子ジャーナル『Nature Communications』に掲載されます。

本研究は、合同研究チームの上田を代表とする文部科学省 X 線自由電子レーザー重点戦略研究課題、文部科学省 X 線自由電子レーザー利用推進研究課題、理化学研究所 SACLA 利用装置提案課題、共同研究拠点課題の各事業の一環として行われました。

## 【詳細な説明】

### 1. 背景

自由電子レーザーの誕生により、極紫外光から X 線に至る幅広い光子エネルギー領域で、非常に強力かつ、照射時間が 10 フェムト秒（1 フェムト秒は千兆分の 1 秒）のオーダーである極短光パルスの利用が可能となりました。日本では SPring-8 キャンパスに建設された SCSS 試験加速器が、世界で 2 番目の極紫外領域の自由電子レーザー装置として稼働し、気相系から凝縮系にいたる様々な物質の非線形光学現象の研究分野で多くの成果を創出しました。自由電子レーザーの強力な極紫外光パルスを物質に照射すると、物質中の多数の電子が同時に励起される多重励起状態が過渡的に実現されます。この多重励起状態は電子を放出することでエネルギーを放出し、緩和すると予想されますが、緩和機構の詳細はよく知られていません。本研究では、この緩和機構を解明することを目指して、ネオン原子が集まってできたネオン・クラスターを標的として、イオン化エネルギーよりもわずかに低い光子エネルギーの極紫外光パルスを照射し、放出される電子の運動エネルギーを計測しました。

### 2. 研究の手法と成果

物質はイオン化エネルギーよりわずかに低いエネルギーに固有の励起状態を複数持ちます。光子エネルギーを調整した光を照射する事で、電子を占有軌道<sup>\*4</sup>から特定の非占有軌道<sup>\*4</sup>に遷移させて、このような励起状態を生成することが出来ます。ネオン原子にも複数の励起状態があり（図 1-i）、特定の光子エネルギーの極紫外光を用いて特定の原子励起状態を生成することが可能です。したがって、SCSS の強力な極紫外光パルスの照射により、原子の集団であるクラスター中の多数の原子を同時に励起することで、クラスターの多重励起状態を瞬時に生成することができます。このようなクラスターの多重励起状態は非常に不安定なため、すぐに電子を放出して緩和すると予想されます。従って、このような過渡的な短寿命状態を瞬時に生成するには、SCSS が提供する照射時間が 30 フェムト秒ほどの極短光パルスの使用が必須です。

本研究では、真空中に平均原子数が 5000 個のネオン・クラスターを作成し、SCSS で得られる極紫外光パルスを照射して、放出される電子のスペクトルを運動量画像計測法と呼ばれる手法で計測しました（図 2）。照射する光のエネルギーを、ネオン原子の 2p 軌道にある電子が 3d リュードベリ軌道<sup>\*5</sup>に遷移するエネルギー 20.3eV に調整し（図 1-i）、ネオン・クラスターの中に多数の 3d リュードベリ原子励起状態を生成しました（図 1-ii）。このようにして生成したクラスターの多重励起状態の緩和に伴う電子スペクトルを計測したところ、電子スペクトルに複数の特徴的なピークを観測しました。ピークを帰属した結果、近接する 2 つの 3d 励起状態原子の一方で電子が 3d 軌道から 2p 軌道に遷移して原子基底状態に戻るのではなく、3d 軌道よりもわずかに低いエネルギーの 3p 軌道や 3s 軌道に遷移し、その遷移に伴う余剰エネルギーを近接する励起原子に与えてその 3d 軌道の電子を放出してイオンを生成する、という予想もされていなかった緩和の機構（図 1-iii）が見出されたのです。我々は新たに解明したこの機構を「リュードベリ原子間クーロン緩和」（IntraRydberg Interatomic Coulombic Decay）と名付けました。また、リュードベリ原子間クーロン緩和によって生成する 3p や 3s 励起状態原子も更に他の励起原子と相互作用して緩和します。このようにして様々なエネルギーをもった電子が数珠つなぎで飛び出して

くる「原子間クーロン緩和カスケード」(Interatomic Coulombic Decay Cascades) (図 1-iv) も本研究で初めて解明された機構です。クラスターの多重励起状態を取り扱う理論計算は実験スペクトルを良く再現しており、リュードベリ原子間クーロン緩和も原子間クーロン緩和カスケードも 10 フェムト秒から 100 フェムト秒のオーダーの非常に短い時間に起こる超高速過程であることを示唆するものでした。

### 3. 今後の展望

本研究で初めて詳細な機構が解明されたリュードベリ原子間クーロン緩和や原子間クーロン緩和カスケードでは、原子集団の中の多数の原子が励起した多重励起状態から、多数の低エネルギー電子が次々と数珠つなぎで飛び出てきます。本研究では、極紫外自由電子レーザーを用いて原子集団中の多数の原子を瞬時に励起して効率よく多重励起状態を生成しましたが、光子エネルギーが非常に高い X 線自由電子レーザーを原子集団に照射しても、過渡的に多重励起状態が多く生成することが最近の研究からわかってきました。放射線治療にも応用されている高エネルギーイオンや X 線の照射によっても、放射線感応分子の周りに複数の励起原子が過渡的に生成されると予想されます。従って、今回解明した低エネルギー電子を数珠つなぎで放出して多くのイオンを生成する新しい緩和過程は、放射線損傷や放射線治療にも重要な役割を果たしていると思われる。




図 1. (i) 1 光子吸収によるネオン原子の電子励起と、(ii) 多原子励起したネオン・クラスタの模式図。実丸は電子、白丸は空孔を表す。(iii) に新たに見出されたリュードベリ原子間クーロン緩和を、(iv) に原子間クーロン緩和カスケードの模式図を示す。(iii)、(iv) の中で、青の矢印はリュードベリ原子間クーロン緩和を、オレンジの矢印は続いて起きる原子間クーロン緩和カスケードを、緑の矢印は仮想光子のやり取りによるクーロン相互作用を表す。




図 2. 本研究で用いた手法。実験では、電子の画像データからエネルギー分布を得た。実験で得られた電子スペクトルのピークの帰属と理論計算から、多重励起緩和機構を検証した。

### 【用語解説】

#### \*1 自由電子レーザー (FEL : Free-Electron Laser)

自由電子レーザー (Free-Electron Laser)は、物質中で発光する通常のレーザーと異なり、物質からはぎ取られた自由な電子を加速器の中で光速近くに加速し、周期的な磁場の中で運動させることにより、レーザー発振を行う。極紫外領域から X 線領域で発振可能なレーザーであり、可干渉性、短いパルス幅、高いピーク輝度を持つ。

#### \*2 SCSS 試験加速器

SCSS 試験加速器は、日本の X 線自由電子レーザー施設 SACLA の実現可能性評価を目的として 2005 年に建設された極紫外領域の自由電子レーザー装置であり、2008 年 5 月から本格的な利用が開始された。世界で 2 番目に極紫外領域での発振に成功した極紫外自由電子レーザー装置であり、コンパクト XFEL 加速器システムの原理実証とともに、X 線自由電子レーザー利用のための装置として、原子分子科学、非線形光学、コヒーレント回折イメージング、光学素子のダメージ、発光素子の研究等様々な研究に用いられた。現在は、SACLA の軟 X 線 FEL ビームラインである「SXFEL ビームライン」専用の加速器として稼働している。

詳細は、<http://xfel.riken.jp/topics/20160426.html>

#### \*3 クラスター

原子・分子が複数個集まって生成した集団のことをクラスターと呼ぶ。不活性な原子でも、原子間に働く弱い引力 (ファンデルワールス力) により数個から数万個を超えるサイズのクラスターを生成することができ、気相でも固相でもないその中間にある状態として注目されている。

#### \*4 占有軌道と非占有軌道

原子や分子中の電子は電子軌道に収容されている。原子や分子の基底状態電子配置にお

いて電子がすでに入っている軌道を占有軌道、入っていない軌道を非占有軌道と呼ぶ。電子は光を吸収して占有軌道から非占有軌道に遷移する。

#### \*5 リュードベリ軌道

原子を構成する電子の1つが残りの正イオンから十分に離れて運動する際の電子の軌道。このリュードベリ軌道は水素原子の電子に似た運動をし、その主量子数  $n$  ( $=1, 2, 3, \dots$ ) と軌道角運動量 ( $s, p, d, \dots$ ) で特徴づけられる。

#### 【論文情報】

雑誌名 : Nature Communications

論文タイトル : Interatomic Coulombic Decay Cascades in Multiply Excited Neon Clusters

著者名 : K. Nagaya, D. Iablonskyi, N. V. Golubev, K. Matsunami, H. Fukuzawa, K. Motomura, T. Nishiyama, T. Sakai, T. Tachibana, S. Mondal, S. Wada, K. C. Prince, C. Callegari, C. Miron, N. Saito, M. Yabashi, Ph. V. Demekhin, L. S. Cederbaum, A. I. Kuleff, M. Yao and K. Ueda

DOI 番号 : 10.1038/NCOMMS13477.

#### 問い合わせ先

東北大学多元物質科学研究所

教授 上田 潔 (うえだ きよし)

電話 022-217-5381

E-mail ueda@tagen.tohoku.ac.jp

京都大学大学院理学研究科

助教 永谷 清信 (ながや きよのぶ)

電話 075-753-3772

E-mail nagaya@scphys.kyoto-u.ac.jp

広島大学大学院理学研究科

助教 和田 真一 (わだ しんいち)

電話 082-424-7401

E-mail swada@sci.hiroshima-u.ac.jp

産業技術総合研究所 企画本部報道室

電話 029-862-6216

E-mail press-ml@aist.go.jp

理化学研究所 広報室 報道担当

電話 048-467-9272

E-mail ex-press@riken.jp

高輝度光科学研究センター 普及啓発課

電話 0791-58-2785

E-mail kouhou@spring8.or.jp