

令和9年度広島大学理学部

数学科

第3年次編入学試験学力検査問題

筆記試験（微積分，線形代数，集合と論理）（5問）

令和8年10月3日

自 9時00分

至 12時00分

答案作成上の注意

- 1 この問題冊子には，微積分，線形代数，集合と論理の問題が計5問ある。総ページは，表紙を入れて6ページである。
- 2 解答用紙は，5枚ある。解答はすべて問題番号と同じ番号の解答用紙の所定の解答欄（表面と裏面）に記入すること。
- 3 下書き用紙は，各受験者に2枚ある。
- 4 受験番号は，すべての解答用紙と下書き用紙の所定の欄に必ず記入すること。
- 5 配付した解答用紙，下書き用紙は，持ち出さないこと。

[1] $\tan^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ を正接関数 $\tan : \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ の逆関数とする。

以下の問いに答えよ。

(1) $y = \tan^{-1} x$ に対して

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{1+x^2}$$

が成り立つことを、逆関数の微分法を用いて示せ。

(2) 関数 $f(x)$ を

$$f(x) = x \tan^{-1} x - \frac{1}{2} \log(1+x^2)$$

とおくとき、 $f(x)$ の導関数 $f'(x)$ を求めよ。

(3) 任意の実数 x に対して、不等式

$$x \tan^{-1} x \geq \frac{1}{2} \log(1+x^2)$$

が成り立つことを示せ。

(4) 次の広義積分の値を求めよ。

$$\int_1^{\infty} \left(\tan^{-1} x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2} \right) dx$$

[2] 行列 A を $A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ とする。以下の問いに答えよ。

- (1) A の逆行列 A^{-1} を求めよ。
- (2) A の固有値と固有ベクトルを求めよ。
- (3) $P^{-1}AP$ が対角行列となるような 3 次正則行列 P を一つ求め、そのときの $P^{-1}AP$ を求めよ。
- (4) $V = \left\{ \boldsymbol{v} \in \mathbb{R}^3 \mid \lim_{n \rightarrow \infty} A^n \boldsymbol{v} = \mathbf{0}_3 \right\}$ とおく。ただし、 $\mathbf{0}_3$ は $\mathbb{R}^3$ の零ベクトルを表す。このとき、 V が $\mathbb{R}^3$ の線形部分空間であることを示し、 V の基底を求めよ。

[3] 以下の全ての問いに答えよ。

- (1) X, Y を空でない集合とし, $f: X \rightarrow Y$ を X から Y への写像とする。
このとき, 次の命題 (i), (ii) の真偽を判定し, 真であれば証明を, 偽であれば反例を与えよ。

- (i) $U, V \subset X$ が X の部分集合ならば,

$$f(U \cap V) = f(U) \cap f(V)$$

が成り立つ。

- (ii) $S, T \subset Y$ が Y の部分集合ならば,

$$f^{-1}(S \cap T) = f^{-1}(S) \cap f^{-1}(T)$$

が成り立つ。

- (2) A, B を空でない集合とする。また, 写像 $F: A \rightarrow B, G: B \rightarrow A$ は, 任意の $a \in A$ に対して $G(F(a)) = a$ を満たすとする。このとき, 次の命題 (i), (ii), (iii), (iv) の真偽を判定し, 真であれば証明を, 偽であれば反例を与えよ。

- (i) 任意の $b \in B$ に対して, $a \in A$ が存在して $F(a) = b$ が成り立つ。

- (ii) $a, a' \in A$ が $F(a) = F(a')$ を満たせば, $a = a'$ が成り立つ。

- (iii) 任意の $a \in A$ に対して, $b \in B$ が存在して $G(b) = a$ が成り立つ。

- (iv) $b, b' \in B$ が $G(b) = G(b')$ を満たせば, $b = b'$ が成り立つ。

[4] 以下の全ての問いに答えよ。

(1) 行列 A を $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix}$ とする。

- (i) x, y, z, s, t を未知数とする次の連立方程式 (*) を考える。連立方程式 (*) の解が存在するために定数 a, b が満たすべき条件を求め、解が存在するときの一般解を求めよ。

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -8 \\ 9 \\ b \end{pmatrix} \quad (*)$$

- (ii) 行列 A の階数 $\text{rank} A$ を求めよ。

- (iii) 線形写像 $f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$ を, $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^5$ に対し $f(\mathbf{v}) = A\mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$ と定義する。このとき, f の像 $\text{Im} f$ と f の核 $\text{Ker} f$ の基底をそれぞれ求めよ。

- (2) n 次正方行列 A_n は, a_{ij} を (i, j) -成分 ($i, j = 1, 2, \dots, n$) とする行列である。ただし, $i, j = 1, 2, \dots, n$ に対して,

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (i = j \text{ または } i = j + 1) \\ -1 & (i = j - 1) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

とする。例えば

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

である。

- (i) A_1, A_2, A_3 の行列式を計算せよ。

- (ii) $n = 1, 2, 3, \dots$ に対し, $\det A_{n+2} = \det A_{n+1} + \det A_n$ が成り立つことを示せ。

[5] 以下の問いに答えよ。

(1) 次の条件を満たす正定数 C の値を求めよ。

条件：任意の $t \in (0, \infty)$ に対して

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{Ct}{(x^2 + y^2 + t^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy = 1$$

が成立する。

以下、 C を (1) で求めた正定数とし、 $f(x, y)$ を $\mathbb{R}^2$ 上で定義された関数で、 $\mathbb{R}^2$ 上で連続かつ $\mathbb{R}^2$ 上で有界なものとする。

(2) $t \in (0, \infty)$ とする。このとき、広義重積分

$$\iint_{\mathbb{R}^2} \frac{Ct}{(x^2 + y^2 + t^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot f(x, y) dx dy$$

が収束することを示せ。

(3) $t \in (0, \infty)$ に対して $g(t) = \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{Ct}{(x^2 + y^2 + t^2)^{\frac{3}{2}}} \cdot f(x, y) dx dy$ とおく。

このとき、 $\lim_{t \rightarrow +0} g(t) = f(0, 0)$ が成り立つことを示せ。