

平成29年6月15日

本件の報道解禁につきましては、平成29年6月17日(土)午前0時以降にお願いいたします。

ウイルスに対する反応性が高いT細胞は
「共有T細胞レセプター」を利用していることを解明しました
～有効性の高い細胞免疫療法の開発に大きな期待～

【本研究成果のポイント】

- ウィルス抗原に対して高い免疫応答性を示すT細胞は、個人間で共有されているT細胞レセプター（「共有TCR」）を利用していていることを解明しました。
- 「共有TCR」は、長期免疫記憶を担う「幹細胞様メモリーT細胞」において特に高い頻度で利用されていることを明らかにしました。
- この結果は、多数のT細胞の中から特に強い免疫応答力を持つものを選び出す手掛かりとなり、感染症やがんに対する細胞免疫療法の臨床開発に貢献することが期待されます。

【概要】

広島大学原爆放射線医科学研究所の川瀬孝和助教、美山貴彦大学院生、一戸辰夫教授らの研究グループは、ウィルスに対して高い免疫応答性を示すCD8陽性T細胞は（注1）、ウィルスを認識するために、異なった個人の間で共有されているT細胞レセプター（共有TCR）（注2）を利用していることを解明しました。また、このような「共有TCR」は、長期免疫記憶を担う「幹細胞様メモリーT細胞」（注3）において特に高い頻度で利用されていることを明らかにしました。従来、異なった個人の間で、それぞれがもつ多数のTCRの共通性を比較することは困難でしたが、本研究は、国立病院機構相模原病院臨床研究センター、富山大学医学薬学研究部との共同研究により、次世代シーケンサー（注4）を用いてTCR遺伝子の配列を大量に取得するとともに、ウィルスを認識するTCRを単一細胞のレベルで決定し、「共有TCR」を見出す新しい解析技術の開発によって実現しました。

今回の結果は、多数のT細胞の中から特に強い免疫応答力を持つものを選び出す手掛けとなり、感染症やがんに対する細胞免疫療法の臨床開発に大きく貢献することが期待されます。

この研究成果は、ロンドン時間の2017年6月16日午前10時（日本時間：2017年6月16日午後6時）に、英国科学雑誌「Scientific Reports」オンライン版に掲載されます。

【発表論文】

論文タイトル：

Highly Functional T-cell receptor repertoires are abundant in stem memory T cells and highly shared among individuals

【DOI番号】 DOI: 10.1038/s41598-017-03855-x

著者：

美山貴彦¹、川瀬孝和¹、北浦一孝²、橋木 錬¹、柴田真志¹、大島久美¹、浜名 洋³、岸 裕幸³、村口 篤³、葛島清隆⁴、佐治博夫⁵、新井 理⁶、鈴木隆二²、一戸辰夫¹

1. 広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科研究分野
2. 国立病院機構相模原病院臨床研究センター 臨床免疫学研究室
3. 富山大学医学薬学研究部 免疫学講座
4. 愛知県がん研究センター研究所 腫瘍免疫学部
5. 公益財団法人 HLA 研究所
6. ビッツ株式会社

【背景】

T細胞（Tリンパ球）は、白血球の仲間で、病原体が感染した細胞やがん細胞を攻撃するために、それらの目印（抗原）を見つけるT細胞レセプター（T-cell receptor, TCR）と呼ばれる分子を、細胞1個あたり1種類発現しています。きわめて多様な抗原に対応するために、ヒトの体内のT細胞が利用しているTCRは数千万種類にも及ぶと推測されていますが、それらの中から、特定の抗原を効率良く認識するTCRがどのような規則にしたがって選ばれているかについては、まだ詳しいことがわかっていないません。また、現在、特定の抗原を認識するTCR遺伝子を新たに導入したT細胞を作成し、感染症やがんの治療に利用する研究が活発に進められていますが、その有効性を向上させるために、特に強い免疫応答力を持つTCRを選び出す技術の開発が待望されています。

【研究成果の内容】

TCRは α と β と呼ばれる2つの部品（サブユニット）を使って、ウイルスやがん細胞の「目印」（抗原）を認識しています（図1）。本研究では、まず健康な成人の血液に存在するCD8陽性T細胞からサイトメガロウイルス（CMV）（注5）を認識するものを分離し、まずそれらのT細胞が利用している α サブユニットと β サブユニットの遺伝子配列を、次世代シーケンサーを用いてすべて同定しました。次いで、hTEC10（注6）と呼ばれる技術により、ひとつひとつの細胞において、どの α と β の組み合わせが利用されているかを決定しました。その結果、CMVを認識するT細胞が利用しているTCRのほとんどは、数種類以内のごく限られた α と β のペアによって決定されていることが判明しました（図2・図3）。また、このようにして得られた α と β のペアを、TCRを欠損した細胞株に導入したところ、CMV反応性T細胞の中で高頻度に利用されているTCRほど、CMV抗原に対して強い結合性を示すことを証明しました（図4）。

さらに、健康な成人5名の血液中に存在するT細胞のTCRをお互いに比較したところ、CMV反応性T細胞の中で利用頻度が高いTCRは、CMV感染歴の有無にかかわらず、複数の個人間で共有されていることがわかりました（図5）。また、血液中のT細胞のうち、このような「共有TCR」をもつ細胞の比率は、個人毎に異なっていましたが（0.6-8.7%）、CD8陽性T細胞を、いくつかの機能の異なるグループに分けて調べたところ、「幹細胞様メモリーT細胞」と呼ばれる長期免疫記憶を担う細

胞において、特に「共有 TCR」が高頻度で利用されていることが判明しました(図 6)。

【今後の展開】

今回の研究と同様の方法を用いれば、特定のウイルスやがん細胞に対して特に強い免疫応答力をもつ TCR を多数同定することが可能となります。しかし、優れた免疫応答力がすべての「共有 TCR」に共通の性質であるのか、特定の「共有 TCR」に限られた性質であるのかについては、まだ不明であり、今後さらに検証を行っていく必要があります(図 7)。また、今後、同定された高機能 TCR の遺伝子を患者さんの T 細胞に効率良く導入する技術を開発することが可能となれば、感染症やがんに対する有効性の高い細胞免疫療法の開発につながることが期待されます。

【参考資料】

図1.T細胞はTCRの α と β と呼ばれる2つのサブユニットをアンテナのように使用して、ウイルス感染細胞やがん細胞の目印となるさまざまな抗原を認識している。個人が有するTCRの α サブユニットと β サブユニットの構造はきわめて多様であり、特定のウイルスやがん細胞を認識できるのはごく一部のTCRだけと考えられている。なお、実際には、ウイルスやがん細胞の目印となる抗原は、ヒト白血球抗原(human leukocyte antigens, HLA)という分子の上に提示されており、TCRはウイルスやがんの目印とHLAを同時に認識している(「HLA拘束性」)。




図2. 健常成人の末梢血から分離されたCMV反応性CD8陽性T細胞が発現しているTCRの種類と比率を示す。ドナーVOO1ではID番号#001-41(緑色で示す)のTCRを67.5%使用しており、ドナーVOO4ではID番号#004-71(水色)のTCRを55.2%使用している。




図3. CMV 感染歴をもたない健常者の T 細胞に図2で同定された TCR を遺伝子導入し、CMV 抗原結合能を確認した結果を示す。各解析図の上に示す 5 衔数字は TCR の ID 番号をあらわす。縦軸は CMV 抗原への結合性、横軸は導入した TCR の発現量に相当する。




図4. 同定された CMV 反応性 TCR の CMV 抗原に対する結合性を比較した結果を示す。縦軸は抗原を結合した T 細胞の量、横軸は抗原の濃度に相当する。右の 5 衔数字は図2で同定した TCR の ID 番号を示し、ドナー番号 V001・V004 でもっとも多く存在していた #001-41, #004-71 の結合性が他の TCR よりも高いことがわかる。




図 5. ドナー V001, V004 の血液に存在する CMV 高反応性 TCR は「共有 TCR」であることを示す。それぞれのサークル（円）は 1 種類の TCR に対応しており、サークルが大きいほどその TCR を共有している人数が多いことを表す。縦軸は当該 TCR の存在頻度、横軸はその順位（左に行くほど上位）に相当する。V001, V004 のいずれにおいても存在頻度がもっとも高い TCR（各解析図の一一番左のサークル）は、検討対象となった 5 名全員に共有されていた。




図 6. T 細胞の機能別集団毎の「共有 TCR」の存在頻度を示す。それぞれのサークル（円）は 1 種類の TCR に対応しており、サークルが大きいほどその TCR を共有している人数が多いことを表す（最小のものは共有されていない TCR）。縦軸は当該 TCR の存在頻度、横軸はその順位（左に行くほど上位）に相当する。幹細胞様メモリー T 細胞（SCM）では、上位にランクする TCR のほとんどが「共有 TCR」であることがわかる。（Naive, ナイーヴ T 細胞； SCM, 幹細胞様メモリー T 細胞； CM, セントラルメモリー T 細胞； EM, エフェクターメモリー T 細胞； EFF, エフェクター T 細胞）





図7. 特定の個人（Aさん）から見出されたウイルス抗原高反応性TCRが、他の個人（BさんとCさん）からも見つかる「共有TCR」であることを示す模式図。TCRが強く認識する抗原は標的細胞のHLAによっても規定されていることから、Bさん、CさんがAさんと同じHLAを持っていない場合には、Bさん、Cさんの「共有TCR」がAさんと同じウイルスに対して高反応性を示すとは限らない。一方、BさんとCさんの「共有TCR」は他の抗原（抗原X、抗原Y）に対して高反応性を示す可能性があることを仮説として示す。



【用語解説】

注1) CD8 陽性 T 細胞 :

細胞の表面に CD8 と呼ばれるタンパク質を発現し、病原体に感染した細胞やがん細胞に対する細胞傷害機能をもつ T 細胞（キラー T 細胞）。

注2) T 細胞レセプター (TCR) :

T 細胞がさまざまな異物（抗原）を見分け、それらに結合するための細胞表面タンパク質。

注3) 幹細胞様メモリー T 細胞 :

組織幹細胞と同様に自己複製能が高く、長い寿命を持ち、他のメモリー T 細胞の供給源となる細胞。T 細胞には、機能的に異なるさまざまな亜集団があり、メモリー T 細胞は、一度遭遇した抗原に対する「免疫の記憶」を担う細胞。その中でも、幹細胞様メモリー T 細胞は免疫記憶の長期間の維持に関与していると考えられている。

注4) 次世代シーケンサー :

DNA や RNA の遺伝子配列を、高速で大量に解読する装置。

注5) サイトメガロウイルス (CMV) :

ヘルペスウイルス科に属する DNA ウィルス。初感染を起こした後、終生体内に残存する。日本人成人における既感染率は、欧米と比して高く、ほとんどが乳幼児期に感染を受けていると考えられているが、近年、若年者層においては感染率が減少している。

注6) hTEC1O :

Human T-cell Receptor Efficient Cloning within 10 days の略称。T 細胞 1 個毎に α サブユニットと β サブユニットの遺伝子配列を短期間で決定することができる技術。(Kobayashi E, et al. Nat Med 2013;19:1542)

【お問い合わせ先】

<研究に関するご質問>

広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科研究分野
教授 一戸 辰夫

Tel : 082-257-5861 FAX : 082-256-7108

E-mail : nohe@hiroshima-u.ac.jp

<報道に関するご質問>

広島大学 財務・総務室広報部 広報グループ
坂本 晃一
TEL: 082-424-6762 FAX: 082-424-6040

発信枚数：A4版 8枚（本票含む）